

MONGE VETSOLUTION GASTROINTESTINAL 2 KG – LINIA WETERYNARYJNA

Karma Monge VetSolution Gastrointestinal to kompletna karma dietetyczna, opracowana w celu ograniczenia ostrych zaburzeń flory bakteryjnej jelit występujących u dorosłych psów. Karma zawiera dysmutazę ponadtlenkową (SOD), która chroni przed stresem oksydacyjnym, wyciąg z kasztanowca, który wspiera pracę jelit, ksyloligosacharydy (XOS), które chronią florę bakteryjną jelit oraz zwiększoną ilość elektrolitów i wysoko przyswajalnych składników.



Skład: odwodnione mięso kurcząt (wysoko przyswajalne), tapioka, ziemniaki, tłuszcz zwierzęcy (olej z kurczaka oczyszczony w 99,6%, konserwowany naturalnymi przeciwutleniaczami), suszone jaja (wysoko przyswajalne), hydrolizowane białko łosia, groch odwodniony, olej z ryb (olej z łosia oczyszczony w 99,6%, konserwowany naturalnymi przeciwutleniaczami), suszona ryba (sardela), sproszkowane strąki szarańczyny strąkowego, włókno grochu, suszone mięso kaczki, drożdże browarnicze, suszona pulpa buraczana, ksyloligosacharydy (XOS 0,4%), minerały, wyciąg z kasztanowca (0,01%), suszone Lactobacillus acidophilus, suszone Lactobacillus casei, suszone Lactobacillus plantarum, suszone Streptococcus thermophilus, liofilizowany koncentrat soku z melona (0,005%- źródło dysmutazy ponadtlenkowej).

Składniki analityczne: białko surowe 32%, włókno surowe 2,3%, oleje i tłuszcze surowe 18%, substancja nieorganiczna 6,7%, sód 0,2%, potas 1,1%.

Dodatki dietetyczne: witamina A 25 000 IU, witamina D3 1600 IU, żelazo (E1) 145mg, jod (E2) 2,2mg, miedź (E4) 12mg, mangan (E5) 30mg, cynk (E6) 150mg, selen (E8) 0,27mg, L-karnityna 200mg, tauryna 0,1%.

Dodatki technologiczne: naturalna mieszanka tokoferoli i wyciągu z rozmarynu lekarskiego (rosmarinus officinalis).

Wskazania: ostry i przewlekły nieżyt żołądka i jelit, zapalenie okrężnicy, zaparcia, zaburzenia wchłaniania, biegunka, przerost bakterii w jelicie cienkim (SIBO), niewydolność i zapalenie trzustki.

Przeciwwskazania: Cięża, laktacja, wzrost.

Instrukcja podawania: przed zastosowaniem i przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z weterynarzem. Zalecana długość stosowania: od 1 do 2 tygodni. Zalecaną dzienną dawkę należy podawać w dwóch posiłkach. Zwierzę powinno mieć zawsze dostęp do świeżej i czystej wody

Waga psa (kg)	5	7	9	11	13	15	17	19	21	25	30	40
Sugerowana porcja (g/dzień)												
Pies szczupłej budowy ciała	105	135	165	190	215	240	265	285	310	350	405	500
Pies normalnej budowy ciała	90	120	140	165	185	210	230	250	270	305	350	435
Pies z nadwagą	80	100	125	145	165	180	200	215	235	265	305	380