

MONGE VETSOLUTION GASTROINTESTINAL 400g-1,5 KG – LINIA WETERYNARYJNA

Karma Monge VetSolution Gastrointestinal to kompletna karma weterynaryjna dla dorosłych kotów, opracowana w celu ograniczenia ostrych zaburzeń flory bakteryjnej jelit. Karma zawiera dysmutazę ponadtlenkową (SOD), która chroni kota przed stresem oksydacyjnym, wyciąg z kasztanowca, który wpływa dobroczynnie na pracę jelit, ksyloligosacharydy (XOS), które chronią florę bakteryjną jelit oraz zwiększoną ilość elektrolitów i wysoko przyswajalnych składników.



Skład: Suszone mięso wieprzowe, tapioka, ziemniaki, hydrolizowane białko łososia, tłuszcz zwierzęcy (olej z kurczaka oczyszczony w 99,6%, konserwowany naturalnymi przeciwutleniaczami), tłuszcz zwierzęcy (tój oczyszczony w 99,6%, konserwowany naturalnymi przeciwutleniaczami), włókno grochu, olej z ryb (olej z łososia oczyszczony w 99,6%, konserwowany naturalnymi przeciwutleniaczami), groch odwodniony, suszona ryba (sardela), minerały, ksyloligosacharydy (XOS 0,4%), ananas, wyciąg z kasztanowca (0,01%), suszone Lactobacillus acidophilus, suszone Lactobacillus casei, suszone Lactobacillus plantarum, suszone Streptococcus thermophilus, liofilizowany koncentrat soku z melona (0,005%- Cucumis melo cantalupensis- źródło dysmutazy ponadtlenkowej), białko mleczne w proszku.

Składniki analityczne: białko surowe 32%, włókno surowe 5%, oleje i tłuszcze surowe 20%, substancja nieorganiczna 6,9%, sód 0,4%, potas 1,2%.

Dodatki dietetyczne: witamina A 25 000 IU, witamina D3 1 500 IU, żelazo (E1) 122mg, jod (E2) 2,2mg, miedź (E4) 12mg, mangan (E5) 30mg, cynk (E6) 150mg, selen (E8) 0,28mg, L-karnityna 100mg, tauryna 0,33%.

Dodatki technologiczne: naturalna mieszanka tokoferoli i wyciągu z rozmarynu lekarskiego (rosmarinus officinalis).

Wskazania: ostry i przewlekły nieżyt żołądka i jelit, zapalenie okrężnicy, zaparcia, zaburzenia wchłaniania, biegunka, przerost bakterii w jelicie cienkim (SIBO), niewydolność trzustki, zapalenie trzustki, rekonwalescencja.

Przeciwwskazania: ciąża, laktacja, wzrost.

Instrukcja podawania: przed zastosowaniem i przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z weterynarzem. Zalecana długość stosowania 1 do 2 tygodni. Zalecaną dzienną dawkę należy podawać w dwóch posiłkach. Zwierzę powinno mieć zawsze dostęp do świeżej i czystej wody

Waga kota (kg)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sugerowana porcja (g/dzień)									
Kot szczupłej budowy ciała	30	40	45	55	65	70	80	90	95
Kot normalnej budowy ciała	25	35	45	50	60	66	75	80	90
Kot z nadwagą	25	30	40	50	55	60	70	75	80