

## MONGE VETSOLUTION URINARY OXALATE 400g-1,5 KG – LINIA WETERYNARYJNA

Karma Monge VetSolution Urinary Oxalate to kompletna karma weterynaryjna dla dorosłych kotów, opracowana w celu ograniczenia tworzenia się kamieni szczawianowych. Karma zawiera dysmutazę ponadtlenkową (SOD), która chroni kota przed stresem oksydacyjnym, wyciąg z zielonej herbaty o właściwościach antyutleniających i antyzapalnych oraz ksylooligosacharydy (XOS), które chronią florę bakteryjną jelit. Karma charakteryzuje się niską zawartością wapnia, witaminy D oraz właściwościami powodującymi alkalizowanie moczu.



**Skład:** hydrolizowane białko łososia, tapioka, ziemniaki, suszone mięso kurcząt, białko ziemniaczane, groch odwodniony, tłuszcz zwierzęcy (olej z kaczki)\*, odwodniona marchew, olej z ryb (olej z łososia)\*, włókno grochu, odwodniony ananas, minerały, suszona pulpacytusowa, ksylooligosacharydy (XOS 0,4%), wyciąg z zielonej herbaty (0,015%), liofilizowany koncentrat soku z melona (0,005%- Cucumis melo cantalupensis- źródło dysmutazy ponadtlenkowej), białko mleczne w proszku\* oczyszczony w 99,6% konserwowany naturalnymi przeciwutleniaczami.

**Składniki analityczne:** białko surowe 33%, włókna surowe 2,5%, oleje i tłuszcze surowe 15%, substancja nieorganiczna 6,5%, wapń 1%, fosfor 0,8%, sód 0,18%, magnez 0,07%, potas 1,2%, chlorki 0,6%, siarka 0,15%, łączna zawartość witaminy D 1350mg/kg, hydroksyprolina 0,08%, kwasy tłuszczowe n-3 0,8%, kwasy tłuszczowe n-6 2%, substancje alkalizujące mocz: cytrynian potasu 1,1%.

**Dodatki dietetyczne/Kg:** witamina A 15000 IU, witamina D3 900 IU, E1 żelazo 113mg, E2 (jodyna) 1mg, E4 (miedź) 8mg, E5 (mangan) 19mg, E6(cynk) 90mg, E8 (selen) 0,35mg, L-karnityna 100mg, Tauryna 0,2%.

**Dodatki technologiczne:** naturalne wyciągi bogate w tokoferol (Rosmanirus officinalis L.)

**Wskazania:** kruształy szczawianu, kamica szczawianowa, idiopatyczne zapalenie pęcherza (syndrom bolesnego pęcherza), śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego.

**Przeciwwskazania:** okres wzrostu, ciąża, laktacja, zapalenie trzustki, kamica struwitowa.

**Instrukcja podawania:** przed zastosowaniem i przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z weterynarzem. Zalecana długość stosowania: początkowo do 6 miesięcy. Zalecaną dzienną dawkę należy podawać w dwóch posiłkach. Zwierzę powinno mieć zawsze dostęp do świeżej i czystej wody.

Waga kota (kg)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sugerowana porcja (g/dzień)									
Kot szczupłej budowy ciała	30	40	50	60	65	75	80	90	95
Kot normalnej budowy ciała	25	35	45	55	60	70	75	85	90
Kot z nadwagą	25	35	40	50	55	65	70	75	85